



**АМИНОКИСЛОТНОЕ
УДОБРЕНИЕ
«ФЕНИВЕТ ОРГАНИКА»**



*Жидкое удобрение
на основе комплекса
свободных аминокислот
«Фенивет Органика»*



Характеристика и применение

«ФЕНИВЕТ ОРГАНИКА» — КОМПЛЕКСНЫЙ АГРОХИМИКАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сбалансированный состав: включает 16 протеиногенных аминокислот и 11 макро- и микроэлементов, терпеновые кислоты.

Оптимальная кислотность: обеспечивает эффективное усвоение питательных веществ на разных типах почв.

Универсальность: подходит для широкого спектра культур.



Состав и его значение

АМИНОКИСЛОТЫ

(16 ВИДОВ) — СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ БЕЛКОВ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В МЕТАБОЛИЗМЕ РАСТЕНИЙ.



- **Лейцин** — стимулирует синтез белков, повышает устойчивость к засухе.
- **Глицин** — улучшает фотосинтез, усиливает рост побегов и формирование плодовых почек.
- **Аспарагиновая кислота** — участвует в азотном обмене, повышает урожайность.
- **Лизин** — укрепляет клеточные стенки, снижает риск грибковых инфекций.
- **Валин** — повышает устойчивость к стрессам (перепады температур, засоление почвы).
- **Треонин** — участвует в синтезе хлорофилла, улучшает качество ягод.
- **Фенилаланин** — предшественник фенольных соединений, усиливает аромат и сахаристость.
- **Аргинин** — стимулирует корнеобразование, ускоряет созревание.
- **Глютаминовая кислота** — регулирует водный баланс, повышает устойчивость к жаре.

- **Метионин** — участвует в синтезе этилена, ускоряет созревание плодов.
- **Пролин** — защищает клетки от окислительного стресса, улучшает лежкость урожая.
- **Триптофан** — предшественник ауксинов, стимулирует рост корневой системы.
- **Аланин** — усиливает накопление сахаров в ягодах, улучшает вкусовые качества.
- **Цистеин** — повышает устойчивость к болезням (милдью, оидиум).
- **Изолейцин** — укрепляет лозу, способствует равномерному вызреванию гроздей.
- **Гистидин** — участвует в антиоксидантной защите, продлевает период вегетации.

МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

(11 ВИДОВ) — ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ, ВОСПОЛНЯЯ ДЕФИЦИТ КЛЮЧЕВЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ.

ТЕРПЕНОВЫЕ КИСЛОТЫ

ОКАЗЫВАЮТ РОСТРЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ФУНГИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ.



Преимущества использования

Комплексное стимулирующее воздействие:

решает несколько задач одновременно благодаря многокомпонентному составу.

Повышенная усвояемость: оптимальная кислотность и форма аминокислот (L-конфигурация) обеспечивают быстрое и эффективное поглощение питательных веществ.

Стрессоустойчивость: помогает растениям легче переносить неблагоприятные условия внешней среды.

Рост урожайности: способствует полноценному развитию растений на всех этапах вегетации.



СНИЖЕНИЕ
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО
СТРЕССА
(НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ АФК*)

*АФК — активные
формы кислорода



СТИМУЛЯЦИЯ
СИНТЕЗА СТРЕССОВЫХ
БЕЛКОВ (НАПРИМЕР,
ДЕГИДРИНОВ
ПРИ ЗАМОРОЗКАХ)



УЛУЧШЕНИЕ
ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ
И МИНЕРАЛОВ
(В ПЕРВУЮ, ОЧЕРЕДЬ
ПРИ ЗАСУХЕ)



Принцип действия

АМИНОКИСЛОТЫ В СОСТАВЕ УДОБРЕНИЯ:

- Активируют метаболические процессы;
- Улучшают синтез хлорофилла;
- Стимулируют корнеобразование и рост побегов;
- Повышают фертильность пыльцы и завязываемость плодов;
- Усиливают устойчивость к патогенам и вредителям.



Важно: для достижения максимального эффекта рекомендуется соблюдать дозировки и сроки внесения, указанные в инструкции производителя, с учётом типа культуры и фазы её развития.



Важное отличие природных аминокислот, активное влияние на почвенный микробиом и мощная синергия с биологическими препаратами.



Фенивет органика

Марка «Аминокомплекс»





СОСТАВ	%
Азот общий (N)	6,0
Фосфор (P ₂ O ₅)	0,6
Калий (K ₂ O)	2,0
Магний (Mg)	0,12
Железо (Fe)	0,05
Цинк (Zn)	0,12
Бор (В)	0,15
Марганец (Mn)	0,16
Молибден (Mo)	0,03
Медь (Cu)	0,15
Кобальт (Co)	0,03
Кальций (Ca)	0,01
Аминокислоты	15,0
Терпеновые кислоты	0,5



Регламент применения

Марка «Аминокомплекс»

для сельскохозяйственного производства:

КУЛЬТУРА, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ
Зерновые, зернобобовые, овощные, технические культуры — предпосевная обработка семян.	0,5–1,5 л/т Расход рабочего раствора — 10–20 л/т
Картофель — предпосадочная обработка клубней.	0,7–2 л/т Расход рабочего раствора — 10–20 л/т
Зерновые культуры — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1–4 раза с интервалом 10–14 дней.	0,5–3 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Кукуруза — некорневая подкормка растений в фазе 2–3 листьев и далее 2 раза с интервалом 10–14 дней.	0,5–3 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Овощные культуры — некорневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов (высадки рассады) и далее 2–5 раз с интервалом 10–14 дней.	1–3 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Свекла сахарная, свекла столовая — некорневая подкормка растений в фазе 4–6 листьев и далее до смыкания рядков 1–3 раза с интервалом 10–14 дней.	1–3 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Технические культуры — некорневая подкормка в течение вегетационного периода 2–4 раза с интервалом 10–14 дней.	0,5–3 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Картофель — некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (высота растений 15–20 см) и далее 1–2 раза с интервалом 10–14 дней.	0,5–3 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Фруктово-ягодные культуры — некорневая подкормка растений в период возобновления вегетации и далее 1–2 раза с интервалом 10–15 дней.	1–3 л/га Расход рабочего раствора — 800–1000 л/га
Цветочно-декоративные культуры — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1–6 раз с интервалом 14–21 день.	0,5–1,5 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га



для ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ:

КУЛЬТУРА, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ
Овощные, цветочно-декоративные культуры — замачивание семян на 1–2 часа.	1,5–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 100–200 мл/100 г семян
Картофель — предпосадочная обработка клубней.	4–5 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1 л/10 кг
Овощные, цветочно-декоративные культуры — некорневая подкормка растений через две недели после появления всходов (высадки рассады) и далее 2–5 раза с интервалом 10–14 дней.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1–1,5 л/10 м ²
Картофель — некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (высота растений 15–20 см) и далее 1–2 раза с интервалом 10–14 дней.	0,5–3 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Земляника — некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязи.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1–1,5 л/10 м ²
Плодовые культуры (деревья) — некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязи.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1–1,5 л/10 м ²
Ягодные культуры (кустарники) — некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязи.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 2–10 л/растение



Фенивет органика

Марка А





МАРКА А — органический корнеобразователь

Повышает ростовую энергию и развитие продуктивной корневой системы, активизирует биологические процессы физиологического развития узла кущения злаковых культур.

СОСТАВ	%
Фосфор (P_2O_5)	10,0
Калий (K_2O)	6,6
Магний (MgO)	5,0
Сера (SO_3)	1,5
Аминокислоты	15,0
Терпеновые кислоты	0,5



Регламент применения

Марка А

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

КУЛЬТУРА, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ
Зернобобовые культуры — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1–3 раза с интервалом 10–14 дней.	0,5–1,5 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Технические культуры — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2–4 раза с интервалом 10–14 дней.	0,5–3,0 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Овощные культуры — некорневая подкормка растений через две недели после появления всходов (высадки рассады) и далее 2–3 раза с интервалом 10–14 дней.	1,0–3,0 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Фруктово-ягодные культуры — некорневая подкормка в фазе бутонизации и далее 2–3 раза с интервалом 10–15 дней.	1,0–3,0 л/га Расход рабочего раствора — 800–1000 л/га
Цветочно-декоративные культуры — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1–6 раз с интервалом 14–21 день.	0,5–2,5 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га



для ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ:

КУЛЬТУРА, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ
Овощные, цветочно-декоративные культуры — некорневая подкормка растений через две недели после появления всходов (высадки рассады) и далее 2–5 раз с интервалом 10–14 дней.	1,0–2,0 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1–1,5 л/10 м ²
Земляника — некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязи.	1,0–2,0 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1–1,5 л/10 м ²
Плодовые культуры (деревья) — некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязи.	1,0–2,0 мл/л воды Расход рабочего раствора — 2–10 л/растение
Ягодные культуры (кустарники) — некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязи.	1,0–2,0 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1,5–2 л/растение



Фенивет органика

Марка В





МАРКА В — органический источник активного кальция

Органические соединения кальция в составе с биологически активными аминокислотами способствуют активизации корневого дыхания и снижает риски поражения гнилями корневой системы, обеспечивает быструю ассимиляцию и перемещение питательных веществ в растении. Активно устраняет признаки острого дефицита кальция в период опыления.

СОСТАВ	%
Азот общий (N)	4,0
Калий (K_2O)	7,5
Кальций (CaO)	12,0
Бор (B)	0,1
Марганец (Mn)	0,1
Цинк (Zn)	0,1
Аминокислоты	15,0
Терпеновые кислоты	0,5



Регламент применения

Марка В

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

КУЛЬТУРА, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ
Овощные культуры — некорневая подкормка растений через две недели после появления всходов (высадки рассады) и далее 2–3 раза с интервалом 10–14 дней.	0,3–0,6 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Плодово-ягодные культуры — некорневая подкормка в фазе бутонизации и далее 2–3 раза с интервалом 10–15 дней.	0,5–1 л/га Расход рабочего раствора — 800–1000 л/га
Картофель — некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и после цветения 1–2 раза с интервалом 10–14 дней.	0,3–0,6 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га



для Личных подсобных хозяйств:

культура, время, особенности применения	доза применения
Овощные, цветочно-декоративные культуры — некорневая подкормка растений через две недели после появления всходов (высадки рассады) и далее 2–5 раз с интервалом 10–14 дней.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1–1,5 л/10 м ²
Картофель — некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (высота растений 15–20 см) и далее 1–2 раза с интервалом 10–14 дней.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1–1,5 л/10 м ²
Земляника — некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязи.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1–1,5 л/10 м ²
Фруктовые культуры (деревья) — некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязи.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 2–10 л/растение
Ягодные культуры (кустарники) — некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязи.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1,5–2 л/растение



Фенивет органика

Марка С





МАРКА С — активный источник бора в комплексе с аминокислотами

Способствует устранению дуплистости корнеплодов, гниению сердцевины у крестоцветных культур, повышает содержание сухих веществ в плодах, предотвращает вершкование культур из-за дефицита бора. Способствует более раннему и равномерному формированию плодов, повышает эффективность фазовых циклов созревания плодов и ягод. Обладает иммуномодуляторными свойствами, предупреждая бактериальные и грибковые заболевания.

СОСТАВ	%
Азот (N)	3,0
Фосфор (P_2O_5)	5,0
Калий (K_2O)	3,0
Бор (B)	5,0
Цинк (Zn)	0,3
Молибден (Mo)	0,1
Марганец (Mn)	0,1
Аминокислоты	15,0
Терпеновые кислоты	0,5



Регламент применения


Марка С

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

КУЛЬТУРА, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ
Зерновые, зернобобовые культуры — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2–3 раза с интервалом 10–14 дней.	0,5–1,5 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Кукуруза — некорневая подкормка 4–6 листьев и далее 1–2 раза с интервалом 10–14 дней.	0,7–3 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Подсолнечник — некорневая подкормка растений в фазе 5–6 листьев и далее 1–2 раза с интервалом 10–14 дней.	0,7–3 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Свекла сахарная, столовая — некорневая подкормка растений в фазе 4–6 листьев и далее 1–2 раза с интервалом 10–14 дней.	1–3 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Картофель — некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и после цветения 1–2 раза с интервалом 10–14 дней.	0,5–1,5 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Технические культуры — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2–4 раза с интервалом 10–14 дней.	0,5–3 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Овощные культуры — некорневая подкормка через две недели после появления всходов (высадки рассады) и далее 2–5 раз с интервалом 10–14 дней.	1–3 л/га Расход рабочего раствора — 100–300 л/га
Фруктово-ягодные культуры — некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и далее 3–5 раз с интервалом 10–15 дней.	1–3 л/га Расход рабочего раствора — 800–1000 л/га

для личных подсобных хозяйств:

КУЛЬТУРА, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ
Овощные, цветочно-декоративные культуры — некорневая подкормка растений через две недели после появления всходов (высадки рассады) и далее 2–5 раз с интервалом 10–14 дней.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1–1,5 л/10 м ²
Картофель — некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (высота растений 15–20 см) и далее 1–2 раза с интервалом 10–14 дней.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1–1,5 л/10 м ²
Земляника — некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязи.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1–1,5 л/10 м ²
Плодовые культуры (деревья) — некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязи.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 2–10 л/растение
Ягодные культуры (кустарники) — некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязи.	1–2 мл/л воды Расход рабочего раствора — 1,5–2 л/растение



An aerial photograph of a lush green agricultural field. A dirt path or road runs diagonally across the middle of the frame. To the left of the path, there is a small, dense cluster of trees. The field is divided into rows, suggesting it is a crop field. The overall color is a vibrant green.

ООО «ИНИТБИО» КОНТАКТЫ

sinkirol@initbio.ru

Тел.: 8 905 020 51 16